

De indicatie bepaalt de intensiteitsgroep waarin de antistollingsbehandeling plaatsvindt:

1e Intensiteitsgroep (1): Therapeutische range INR 2,0 - 3,0

2e Intensiteitsgroep (2): Therapeutische range INR 2,5 - 3,5

Advies t.a.v. startdosering (voor nieuwe patiënten)					
Fenprocoumon/Marcoumar® (tabl. à 3 mg)			Acenocoumarol (tabl. à 1 mg)		
	Normaal	Aangepast**		Normaal	Aangepast**
1e dag	4	3	1e dag	6	4
2e dag	2	1	2e dag	4	2
3e dag	1	½	3e dag	2	1

** Dosering zo nodig aanpassen bijvoorbeeld bij oudere (≥70), zieke of gedecompenseerde patiënt. Aanmelden bij de trombosedienst voor INR bepaling zo snel mogelijk na de 2e dag

Hoofdgroep	Indicatie	Intensiteit
Atriumfibrilleren (AF)	AF, CHA ₂ DS ₂ VASc Score ≥1	1
	AF + (cerebrale) embolie	1
	AF + hartfalen	1
	AF + reumatische mitralishartklepstenose	1
	AF + recidief systemische embolie tijdens antistolling	1
	AF + stent bij acuut coronair syndroom	1
	AF + stent bij stabiel coronair lijden	1
Biokleprothese en overige hartchirurgie	Biokleprothese in mitralispositie	1
	Biokleprothese + Risicofactor ¹	1
	Mitralishartklepreconstructie	1
	Reumatische mitralishartklepstenose + VG ² systemische embolie	1
	Reumatische mitralishartklepstenose + wijd linker atrium >55mm	1
Cardiomyopathie (EF < 35%) bijzonder geval	Cardiomyopathie + intra-cardiale trombus	2
	Cardiomyopathie + aneurysma cordis	1
Cerebrale embolie in bijzondere geval	Cryptogene cerebrale embolie tijdens acetylsalicylzuur / clopidogrel (bij PFO of bij aneurysma atriumseptum)	1
Kunstklep	Mechanische hartkleprothese oude generatie ongeacht positie	2
	Mechanische hartkleprothese ongeacht positie + systemische embolie tijdens adequate antistolling	2
	Mechanische aortahartkleprothese	1
	Mechanische aortahartkleprothese + Risicofactor ¹	2
	Mechanische mitralis hartkleprothese	2
	Mechanische mitralis hartkleprothese + Risicofactor ¹	2
	Mechanische tricuspidalis hartkleprothese	2
	Mechanische tricuspidalis hartkleprothese + Risicofactor ¹	2
	Mechanische pulmonalis hartkleprothese	2
	Mechanische pulmonalis hartkleprothese + Risicofactor ¹	2
Perifeer arterieel vaatlijden in bijzonder geval	Perifere arteriële embolie zonder AF	Op aangeven behandelaar
	Veneuze bypass	1
Pulmonale hypertensie	Pulmonale hypertensie	1
Primaire Veneuze Trombo-Embolie (VTE)	Eerste Longembolie	1
	Eerste DVT been/bekken	1
	Eerste DVT arm	1
	Overige locaties	1
Recidief Veneuze Trombo-Embolie (VTE)	Recidief Longembolie en/of DVT bij adequate cumarinetherapie	2
	Recidief Longembolie en/of DVT zonder adequate cumarinetherapie	1
Overige (zeldzame) indicaties	(Recidiverende) tromboflebitis	Op aangeven behandelaar
	Overige (zeldzame) indicaties	Op aangeven behandelaar

¹ Risicofactor: vergroot atrium, of (VG²) systemische embolie of myocard infarct of lage ejectiefractie of atriumfibrilleren

² Voorgeschiedenis