

Trombosedienst voor het Gooi
T. 035 6854250
F. 035 6833679

Meldformulier : Endoscopie bij VKA (=coumarine) gebruik

Dit formulier dient zo mogelijk 1 week vóór de ingreep / opname in het bezit te zijn van de trombosedienst.

U kunt dit formulier:

verzenden per interne post (voorkeur)

faxen naar F 035 6833679 of mailen naar info@tdhilversum.nl

meegeven aan de patiënt met instructie van afgifte aan trombosedienst

Patiënt gegevens (ponsplaatje) behandelend endoscopist:

paraaf

afdeling..... tel. nr.

type endoscopie:

datum:..../...../..... datum volgt

opname: ja nee

antistollingsindicatie:

antistollingspreparaat: acenocoumarol fenprocoumon marcoumar

Het antistollingsbeleid rond de ingreep is afhankelijk van het trombo-embolie en bloedingsrisico:

<input type="checkbox"/>	laag bloedingsrisico	VKA continueren INR t.t.v. ingreep <2.5 (3.0?)
<input type="checkbox"/>	hoog bloedingsrisico laag tromboserisico	VKA stoppen; INR t.t.v. ingreep <1.8 geen LMWH overbrugging
<input type="checkbox"/>	hoog bloedingsrisico hoog tromboserisico	VKA stoppen; INR t.t.v. ingreep <1.8 LMWH overbrugging klaring: <input type="checkbox"/> > 30 ml.min <input type="checkbox"/> <30 ml/min gewicht patiënt:

De trombosedienst voert de antistollingsbehandeling uit volgens KETEN/003 Protocol antistolling bij endoscopie Tergooziekenhuizen op basis van het trombo-embolie risico en het bloedingsrisico.

De trombosedienst verstrekt zo nodig het vit.K en/of fraxiparine recept aan de patiënt, geeft een advies voor de VKA herstart datum en dosering. De behandelend specialist beslist over het daadwerkelijk herstarten met de antistolling.

Fraxiparine stopt 24 uur voor de ingreep en herstart in principe 24 uur erna.